

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN**

ĐẶNG ĐỨC ĐĂNG

**ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SỰ
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
HOA PHLOX (*Phlox drummondii*).**

**KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN**

Thành phố Hồ Chí Minh

Tháng 6/2012

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN**

ĐẶNG ĐỨC ĐĂNG

**ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN HỮU CƠ ĐẾN SỰ
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA
HOA PHLOX (*Phlox drummondii*).**

Ngành: Cảnh Quan và Kỹ Thuật Hoa Viên

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Người hướng dẫn: Ths. TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG

Thành Phố Hồ Chí Minh

Tháng 6/2012

TÓM TẮT

Tên đề tài: “Ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến sự sinh trưởng và phát triển của hoa phlox” tại vườn ươm bộ môn cảnh quan và kỹ thuật hoa viên – ĐH Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh”.

Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số loại phân hữu cơ đến sinh trưởng và phát triển của hoa Phlox. Thí nghiệm được bố trí kiểu khối hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD= Randomized Complete Block Design), 6 nghiệm thức, 3 lần lặp lại.

Kết quả nghiên cứu:

Qua hai thí nghiệm, ta thấy nếu dùng lượng phân cá với nồng độ là 0,5% kết hợp với phân trùn 20% để bón lót thì thu được kết quả tốt nhất. Như vậy có thể kết luận rằng với lượng bón như nhau nhưng phân trùn được cây hấp thu tốt hơn phân bò là vì phân trùn nhanh tan hơn nên được cây hấp thu nhanh. Nồng độ phân cá và bánh dầu là như nhau nhưng phân cá tốt hơn có thể là do phân cá dễ hòa tan, chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết mà cây hoa Phlox cần hơn so với phân bánh dầu.